

محلول لینسین Linicin® - تداوی شبش سر

- فقط 15 دقیقه تداوی
- هیچگونه خطر مقاومت
- بی بوی و بی رنگ
- حاوی ماده دیمتیکن که منجر به خفگی شبش سر می شود
- همراه با شانه مخصوص
- کلانسالان و اطفال از 6 ماهه به بالا، و برای زنان حامله و شیر ده.
- محلول Linicin را در دواخانه محل به دست می آورید.



از محلول Linicin چگونه استفاده می شود؟

1. یک حوله ی کمرنگ بر شانه ی کسی که تحت تداوی است بیاندازید. بوتل را باز کنید. محلول را با فشردن بوتل در موهای خشک بمالید. تقریباً نصف بوتل برای موی آویخته تا شانه برآورد کنید.



2. محلول را به صورت مساوی در تمام پوست سر تقسیم کنید. از پیشانی به سمت بالای سر کار کنید از بالا به پایین به سمت گوش ها و از بالای سر به پایین به سمت گردن ادامه دهید. محلول را به طور کامل به پوست سرماساژ دهید. از محلول به اندازه کافی برای پوشش تمام موی، از جمله سرموی، استفاده کنید.



3. برای 15 دقیقه صبر کنید. پس از آن قبل از شستن مو با آب آن را با شامپو بشویید.

4. مو را با یک شانه نرم به طور کامل شانه کنید و این تداوی را بعد از 9-10 روز

با محلول Linicin تکرار نمایید.



Linicin is a health technological product. Read the information in the package carefully before use
Marketed by Meda, www.medasverige.se, info@medaotc.com, www.linicin.se